

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව / இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் / Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 1995 අගෝස්තු கல்வியியல் பொதுத் தராதரப்பத்திரம் (உயர் தர)ப் பரீட்சை. 1995 ஓகஸ்த் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 1995			
අද්ධ ගණිතය II தூய கணிதம் II Pure Mathematics II	01 <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>S</td> <td>II</td> </tr> </table>	S	II
S	II		
පැතු තුනයි / மூன்று மணி / Three hours			

ප්‍රශ්න හයකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. චේතලාච්ඡ ප්‍රමේයය ප්‍රකාශකරන්න.

$ABC$  ත්‍රිකෝණයකි.  $D, E, F$  යනු,  $\frac{BD}{DC} = \lambda, \frac{CE}{EA} = \mu$  සහ  $\frac{AF}{FB} = \nu$  වන පරිදි පිළිවෙලින්  $BC, CA, AB$  පාද මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යය වේ; මෙහි  $\lambda, \mu, \nu$  ධන නියත වේ.  $X, Y, Z$  යනු පිළිවෙලින්  $BE$  සහ  $CF, AD$  සහ  $CF, BE$  සහ  $AD$  රේඛාවල ඡේදන ලක්ෂ්‍යය වේ.

$AFC$  ත්‍රිකෝණය සහ  $BE$  රේඛාව සැලකීමෙන්,

$$\frac{CX}{CF} = \frac{\mu(1+\nu)}{1+\mu(1+\nu)}$$

බව සාධනය කරන්න.

තවද,  $\frac{\Delta BXC}{\Delta ABC} = \frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)}$  බව ද සාධනය කරන්න.

$$\frac{\Delta XYZ}{\Delta ABC} = \left[ 1 - \frac{\lambda}{1+\lambda(1+\mu)} - \frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)} - \frac{\nu}{1+\nu(1+\lambda)} \right]$$

බව අපෝහනය කරන්න.

ඒ නඩත්, යේවා ප්‍රමේයයේ විලෝමය සාධනය කරන්න.

2. (i)  $OABCD$  පිරව්වියක ආධාරකය  $ABCD$  සමාන්තරාස්‍රයක් වේ; මෙහි  $AB = 2a, BC = 4a$  සහ  $\widehat{BAD} = 60^\circ$  ද වේ.  $OAB$  ත්‍රිකෝණය සමපාද වන අතර එය ආධාරකයට ලම්බ වේ.  $E$  සහ  $F$  යනු පිළිවෙලින්  $AB$  සහ  $AO$  දරවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වේ.  $OE$  සහ  $DF$  අතර කෝණය  $\tan^{-1}(\sqrt{19})$  බව පෙන්වන්න.

(ii)  $XYZWV$  පිරව්වියේ  $XYZW$  ආධාරකය සමභූතාස්‍රයකි.  $VXY$  සහ  $VYZ$  ත්‍රිකෝණය ආධාරකයේ කලයට ලම්බ වේ.  $VXW$  හා  $VZW$  යන ඉඞිඞි ත්‍රිකෝණය දෙක ආධාරකය සමභූත සමක  $\alpha$  කෝණ සාදයි.  $VXW$  හා  $VZW$  ත්‍රිකෝණය දෙක අතර දිවිකල කෝණය  $\cos^{-1}(-\cos^2 \alpha)$  බව පෙන්වන්න.

3.  $l_1 \equiv ax + by + c = 0$  සහ  $l_2 \equiv a'x + b'y + c' = 0$  රේඛාවල ඡේදන ලක්ෂ්‍යය කරා යන ඕනෑම සරල රේඛාවක සමීකරණය

$$ax + by + c + \lambda(a'x + b'y + c') = 0$$

ලෙස ප්‍රකාශ කළ හැකි බව පෙන්වන්න; මෙහි  $\lambda$  නියතයකි.

$l_1 \equiv lx + my + n = 0$  විචලනය රේඛාව  $l_1$  සහ  $l_2$  රේඛා පිළිවෙලින්  $A$  හි දී හා  $B$  හි දී ඡේදනය කරයි.  $c, c'$  දෙකම නියඳුණ වන අතර ඛණ්ඩාංක මූල  $O$  ය.

$$OA \text{ රේඛාව } OB \text{ ට ලම්බ නම් } (aa' + bb')n^2 - (ac' + ca')ln - (bc' + cb')mn + (l^2 + m^2)cc' = 0$$

බව පෙන්වන්න;

$P$  යනු  $O$  සිට  $lx + my + n = 0$  රේඛාවට ඇදී ලම්බයේ අඩියයි. ඉහත දක්වන අවශ්‍යතාව සපුරාලයි නම්,  $l_2$  රේඛාව විචලනය වන්නේ  $P$  හි පරාස, වෘත්තයක් බව පෙන්වන්න.

$l_1$  සහ  $l_2$  රේඛා එකිනෙකට ලම්බ නම්, එම පරාසට කුමක් වේ ද?

4. (i) එකක අරයෙන් යුත්, කේන්ද්‍ර  $P, Q$  වූ වෘත්ත දෙකක්  $A, B$  ලක්ෂ්‍යවල දී ඡේදනය වන්නේ එකක කේන්ද්‍රය අනිකෙහි පරිධිය මත පිහිටන සේ ය.  $\widehat{APB}$  කෝණය නිරූපණය කර, වෘත්ත දෙකටම පොදු  $R$  පෙදෙසේ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න.

$PQ$  හි මධ්‍යලක්ෂ්‍යය  $O$  මූල ලක්ෂ්‍යය ලෙස ද  $PQ$  රේඛාව  $x$  අක්ෂය ලෙසද  $y$  අක්ෂය ලෙස  $AB$  ද ගනිමින්,  $R$  හි පිහිටි  $X(x, y)$  ලක්ෂ්‍යයක  $x, y$  ඛණ්ඩාංක සඳුරාලිය යුතු අසමානතා කුලසායක් ලියන්න.

- (ii)  $p$  සහ  $\alpha$  යනු  $p > 0$  සහ  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  පරිදි වූ නියත වේ. කාටිසියානු ආකාරයට නොහරවා,

$$r = \frac{p}{\cos \theta \sin \alpha - \sin \theta \cos \alpha} \text{ මූලික සමීකරණය } l \text{ සරල රේඛාවක් නිරූපණය කරන බව පෙන්වන්න.}$$

තවද, මූලික සමීකරණය  $r = 2 \cos \theta$  වන  $C$  වක්‍රයේ දළ සටහනක් ඇද  $C$  සහ  $l$  කාන්තවීක ලක්ෂ්‍යවලදී ඡේදනය වීම සඳහා  $p$  සහ  $\alpha$  අඩංගු අවශ්‍යතාවක් ලබාගන්න.

5.  $ax + by = 1$  සරල රේඛාව  $P_1, P_2$  ලක්ෂ්‍යවල දී  $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$  වෘත්තය හමුවේ.  $O$  යනු ඛණ්ඩාංක මූල ලක්ෂ්‍යය යි.  $OP_1$  හිත්  $OP_2$  හිත් සමීකරණ පිළිවෙළින්  $y = m_1x$  සහ  $y = m_2x$  මගින් ලැබෙන බව පෙන්වන්න; මෙහි  $m_1, m_2$  යනු

$$(1 + 2fb + cb^2)m^2 + (2gb + 2fa + 2abc)m + ca^2 + 2ag + 1 = 0$$

වර්ග සමීකරණයේ මූල වේ.

මේ වෘත්තය, මූල ලක්ෂ්‍යය  $O$  හරහා යයි නම්

- (i)  $O$  ලක්ෂ්‍යය වෘත්තයේ  $C$  කේන්ද්‍රයට යාකරන රේඛාව

$$y = \frac{a(m_1 + m_2) - b(1 - m_1m_2)}{b(m_1 + m_2) + a(1 - m_1m_2)} x$$

බව පෙන්වන්න.

- (ii)  $f, g, a, b$  ඇසුරෙන්  $(y - m_1x)(y - m_2x)$  අගයන්න.

ඒ නයින් ,  $OP_1$  හෝ  $OP_2$  යන කවර රේඛාවක් මත පිහිටි ඕනෑම  $P(x, y)$  ලක්ෂ්‍යයක ඛණ්ඩාංක

$$(1 + 2fb)y^2 + (2gb + 2fa)xy + (2ga + 1)x^2 = 0$$

සමීකරණය සඳුරාලන බව පෙන්වන්න.

6.  $P(ar^2, 2at)$  ලක්ෂ්‍යයේ දී  $y^2 = 4ax$  පරාවලයට ඇඳි අභිලම්භයේ සමීකරණය

$$y + tx = 2at + ar^3$$

බව සාධනය කරන්න.

$Q$  යනු  $(aq^2, 2aq)$  ලක්ෂ්‍යය යැයි ගනිමු.  $q^2 > 8$  නම්, සියල්ලම  $Q$  හරහා යන සේ, පරාවලයට කාන්තවීක ප්‍රතිකර්ම අභිලම්භ කුහක් කිවෙන බව පෙන්වන්න.

$A$  සහ  $B$  යනු, එම ලක්ෂ්‍යවල අභිලම්භ  $Q$  හරහා යන සේ පරාවලය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය දෙකකි.  $C$  යනු  $AB$  හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයද  $D$  යනු  $CQ$  හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය ද වේ.  $Q$  විචලනය වන්නේ

- (a)  $D$  හි සරය පරාවලයක කොටසක් බව ද

- (b)  $(-2a, 0)$  ලක්ෂ්‍යය හරහා  $AB$  යන බව ද

පෙන්වන්න.

7.  $P$  සහ  $Q$  වනාහි විකේන්ද්‍රික කෝණ පිළිවෙළින්  $\theta$  සහ  $\phi$  වූ,  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ඉලිප්සය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය දෙකකි.

$P$  හි දී සහ  $Q$  හි දී ඉලිප්සයට ඇඳි ස්පර්ශකවල  $T$  ඡේදන ලක්ෂ්‍යය සොයන්න.

ඉලිප්සය අන්තර්ගත වන සේ සමාන්තරාස්‍රයක් නිර්මාණය කර ඇත්නම්,  $P$  සහ  $Q$  හි ස්පර්ශක සමාන්තරාස්‍රයේ බද්ධ පාද වන පරිදි ය. සමාන්තරාස්‍රයේ විකර්ණ මූල ලක්ෂ්‍යයෙහි දී ඡේදනය වන බව පෙන්වා, සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය  $4ab |\operatorname{cosec}(\theta - \phi)|$  බව සාධනය කරන්න.

සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය නියතව පවතින සේ  $P$  සහ  $Q$  ලක්ෂ්‍ය විචලනය වේ නම්,  $T$  හි සරය සොයන්න.

8. (a)  $(a \sec \theta, b \tan \theta)$  ලක්ෂ්‍යය  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  බහුවලය මත පිහිටන බව ද  
 (b) එම බහුවලය මත මතුම  $(x, y)$  ලක්ෂ්‍යයක්  $x = a \sec \theta, y = b \tan \theta$  යන්නෙන්  $\theta$  පරාමිතියක් මගින් නිරූපණය කළ හැකි බව ද පෙන්වා, එම පරාමිතිය මගින් සම්පූර්ණ බහුවලය විස්තර කිරීම සඳහා,  $\theta$  හි කුඩාම පරාසයක් දෙන්න.

බහුවලය මත ලක්ෂ්‍යයකදී ස්පර්ශකයේ සමීකරණය ලබා ගන්න.

දී ඇති ලක්ෂ්‍යයක් හරහා යන සේ, සාධාරණ වශයෙන්, බහුවලයට ස්පර්ශක දෙකක් ඇදීම හැකි බව පෙන්වා, එම ස්පර්ශක එකිනෙකට ලම්බ වීම සඳහා අවශ්‍යතාවක් සොයන්න.

ඒ නයින් හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ, බහුවලයට ඇඳී ලම්බ ස්පර්ශකවල ඡේදන ලක්ෂ්‍යයන්හි පථය,  $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$  වන්නය බව පෙන්වන්න.

බහුවලයක විකේන්ද්‍රිකතාව  $\sqrt{2}$  ට වඩා වැඩිනම් තාත්ව්‍ය ස්පර්ශක දෙකක් එකිනෙකට ලම්බ විය නොහැකි බව පෙන්වන්නය කරන්න.

9. (i) සුදුරුවු අංකනයකින්,  $ABC$  ත්‍රිකෝණයක් සඳහා

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

බව සාධනය කරන්න.

$ABC$  ත්‍රිකෝණයක, කුඩාම කෝණය  $A$  ද විශාලතම කෝණය  $C$  ද වන අතර  $C = \frac{\pi}{2} + A$ . පොදු අන්තරය  $d$  වන සමාන්තර ශ්‍රේණියක  $a, b, c$  පාද පිහිටයි.

$$\sin A = \frac{a}{(2a^2 + 4ad + 4d^2)^{\frac{1}{2}}}$$

බව පෙන්වා  $\cos A$  සහ  $\cos 2A$  සඳහා අනුරූප ප්‍රකාශන ලබාගන්න.

$$\frac{a}{d} = \sqrt{7} - 1 \text{ බව අපෝහනය කරන්න.}$$

- (ii)  $ABC$  ත්‍රිකෝණයකි.  $O$  සහ  $H$  පිළිවෙළින් එහි පරිකේන්ද්‍රය සහ ලම්බකේන්ද්‍රය වේ.  $OH$  රේඛාව  $BC$  ට

$$\tan^{-1} \left( \frac{3 - \tan B \tan C}{\tan B - \tan C} \right)$$

කෝණයකින් ආනත වන බව පෙන්වන්න.

10.  $x$  සඳහා විසඳන්න :

- (i)  $3 \cos x - 4 \sin x = 5 \sin kx$ ; මෙහි  $k$  නියතයකි.  
 (ii)  $4 - 4(\cos x - \sin x) - \sin 2x = 0$ .  
 (iii)  $\cos^{-1} x - \sin^{-1} x = \frac{\pi}{6}$ ; මෙහි  $0 \leq \cos^{-1} x \leq \pi$  සහ  $-\frac{\pi}{2} \leq \sin^{-1} x \leq \frac{\pi}{2}$ .

11. (i) පුද්ගල කටයුතුවල යොදන සංගමයක්, එක්තරා ගමන සිටින වයස අවුරුදු කාලයට වැඩි අයට මාසික දීමනාවක් ගෙවීමට සීමා කෙරුණි. දීමනා ක්‍රමය පහත දක්වේ.

වයස් කාණ්ඩය (අවුරුදුවලින්)	මාසික දීමනාව (රුපියල්වලින්)
60 - 65	80.00
65 - 70	85.00
70 - 75	90.00
75 - 80	95.00
80 - 85	100.00

ඉහත දීමනාවට යුද්ධකම් සම් 25 දෙනෙක් එම ගමන සිටිති. ඔවුන්ගේ වයස් අවුරුදුවලින් ඔහු දක්වේ.

74	62	84	72	61	83	72	81	63	71	63	61	61
67	74	66	64	79	73	78	76	69	68	78	67	

ගෙවිය යුතු මධ්‍යම මාසික දීමනාව සහ ව්‍යාප්තියේ සමමත අපගමනය ගණනය කරන්න.

- (ii) කිසියම් පන්තියක ශිෂ්‍යයන් 80 කගේ  $X$  උසෙහි ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යන්‍යය සහ සමමත අපගමනය පිළිවෙළින් 135.3 cm සහ 9.6 cm වේ.  $Y = \frac{X-a}{b}$  ආකාරයේ යුද්ධ පරිණාමනයකින්  $X$  පරිණාමනය කළ විට, ශිෂ්‍යයන්ගේ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය පහත දක්වේ; මෙහි  $a$  සහ  $b$  නියතයන්ය.

$Y$ හි අගය	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
සංඛ්‍යාතය	2	5	8	18	22	13	8	4

තර්‍ය පන්ති ප්‍රාන්තර ගණනය කරන්න.

12. (i) එක්තරා නගරයක  $A, B, C$  නම් ප්‍රචණ්ඩ පත්‍ර භූතක් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ. වැඩිපමණක් 20% ක්  $A$  ද 16% ක්  $B$  ද 14% ක්  $C$  ද 8% ක්  $A$  සහ  $B$  ද 6% ක්  $A$  සහ  $C$  ද 4% ක්  $B$  සහ  $C$  ද 2% ක් පත්‍ර භූත ද කියවන බව සමීක්ෂණයකින් නිගමනය වේ.

සමමතාරී ලෙස තෝරාගත් කෙතෙකු

- එකම පත්‍රයකටත් නොකියවීමේ
- $C$  නොකියවීමේ
- $A$  කියවන නමුත්  $B$  නොකියවීමේ
- අවිච්ඡේදයෙන් පත්‍ර දෙකකටත් කියවීමේ

සමමතාරීකාරී සොයන්න.

- (ii) කිසියම් වර්ගයක එක් ශාකයක සිටින කෘමීන් සංඛ්‍යාව දක්වන  $X$  සමමතාරී විචලනය පහත දක්වන සමමතාරීකාරී ව්‍යාප්තිය ගනී.

$X = x$	0	1	2	3	4	5
$P\{X = x\}$	0.10	1.8a	0.20	0.20	$a^2$	0.10

- වෙනත් අගයක්  $X$  නොගනී යැයි උපකල්පනය කර  $a$  සඳහා පිළිගත හැකි අගය ගණනය කරන්න.
- $X$  හි මධ්‍යන්‍යය සහ විචලනය සොයන්න.
- සමමතාරී ලෙස තෝරා ගත්, ඉහත දී වර්ගයේ ශාක 10 ක ගොඩකින් කෘමීන් නොමැති ශාක ගණන  $Y$  සමමතාරී විචලනයක් දක්වේ.  $Y$  හි සමමතාරීකාරී ව්‍යාප්තිය සොයන්න. ඒ නමින්,  $Y$  හි මධ්‍යන්‍යය ද විචලනය ද සොයන්න.